



Kemoterapi Tedavisi Gören Kanser Hastalarının Cinsellik Algılarının ve Cinsel Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Determination of Sexual Perceptions and Sexual Care Needs of Cancer Patients Receiving Chemotherapy Treatment

Öznur KÖRÜKCÜ¹, Fatma ARIKAN¹, Ayşegül KÜÇÜKÇAKAL², Hasan Şenol COŞKUN²

¹Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye

²Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

Yazışma Adresi
Correspondence Address

Öznur KÖRÜKCÜ
Akdeniz Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi,
Antalya, Türkiye
E-posta:
oznurkorukcu@akdeniz.edu.tr

ÖZ

Amaç: Çalışma Akdeniz Üniversitesi Gündüz Kemoterapi Ünitesinde tedavi alan, kolorektal ve jinekolojik kanseri olan hastaların cinsellik algılarını ve cinsel bakım gereksinimlerini her iki kanser türü için ayrı ayrı belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma verileri Ekim 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Gündüz Kemoterapi Ünitesinde tedavi alan, kolorektal ya da jinekolojik kanser tanısı olan 75 hastadan toplanmıştır. Elde edilen veriler, yüzde, ortalama, standart sapma ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların %66,7'si kadın, %33,4'ü erkeklerden oluşmaktadır; %42,7'si jinekolojik kanser, %57,3'ü ise kolorektal kanser sebebiyle tedavi görmektedir. Kemoterapi sürecinde hem kadınların (%76), hem de erkeklerin (%72) çoğunun cinsel yaşamının olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Kemoterapi sürecinde kadınların %90'ının, erkeklerin ise %96'sının cinsel ilişki sıklığı azalmıştır. Hastaların çoğu kemoterapi süresince kaliteli bir cinsel yaşamı olabileceğini düşünmemektedir. Kemoterapi sürecinde hastaların %74,7'sinde cinsel istekte azalma olmuştur. Hastaların %33,3'ü kemoterapi tedavisinden sonra cinsel ilişki sıklığının azaldığını, %28'i ilişigi süresinin kısallığını ve kalitesinin azaldığını, %38,7'si ise kemoterapi almaya başladıkten sonra hiç cinsel ilişkiye girmedigini belirtmiştir.

Sonuç: Kemoterapi sürecinde hem kadın, hem erkek hastaların cinsel yaşamlarının olumsuz etkileniği görülmüştür. Her iki kanser türünde de tedavi süreciyle cinsel isteklerinin, cinsel ilişki sıklıklarının, eşlerinin kendilerine olan ilgisinin azaldığı belirlenirken; tedavi sürecinde kolorektal kanseri olan hastaların cinsel yaşamlarının jinekolojik kanser hastalarına göre daha fazla kısıtlandığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Cinsellik, Kemoterapi, Kolorektal kanser, Jinekolojik kanser

Geliş tarihi \ Received : 25.05.2017
Kabul tarihi \ Accepted : 06.07.2017

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to determine sexuality perceptions and sexual needs of patients with colorectal and gynecological cancer who were treated at the Akdeniz University Day Chemotherapy Unit.

Material and Methods: The study data was collected from 75 patients who were diagnosed with colorectal or gynecological cancer at Akdeniz University Day Chemotherapy Unit between October 2016 and April 2017. The obtained data were evaluated using percentage, mean, standard deviation values and the chi-square test.

Results: While 66.7% of the participants were women, 33.4% were men; 42.7% were treated for gynecological cancer and 57.3% for colorectal cancer. The sexual activity of both women (76%) and men (72%) was negatively affected in the process of chemotherapy. During the chemotherapy period, 90% of the women and 96% of the men had a lower incidence of sexual intercourse. Most of the patients did not think that they could have a good sexual life during chemotherapy. During the chemotherapy period, 74.7% of the patients had a decrease in sexual desire. Some of the patients (33.3%) stated that the frequency of sexual intercourse decreased after chemotherapy treatment, 28% had shortened duration of relationship and decreased quality, and 38.7% stated that no sexual intercourse took place after taking chemotherapy.

DOI: 10.17954/amj.2018.101

Conclusion: We observed that the sexual lives of both female and male patients are adversely affected in the course of chemotherapy. Sexual desire, frequency of sexual intercourse, and the spouse's interest decreased with both types of cancer. The sexual life of patients with colorectal cancer was more restricted than that of gynecologic cancer patients during the treatment period.

Key Words: Sexuality, Chemotherapy, Colorectal cancer, Gynecological cancer

GİRİŞ

Cinsellik biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla ele alınması gereken, sosyal kurallardan ve değer yargılarından etkilenen, ataerkil toplumlarda tabu olarak algılanabilen temel insan gereksinimlerinden biridir (1,2). Kanser tanısı konulmasından sonra uygulanan tıbbi ve cerrahi tedavinin bireylerin yaşam kalitesi üzerine pek çok olumsuz etkisi olduğu gibi, cinsel sağlık üzerine de etkileri bulunmaktadır (3). Kanser hastalığı ve tedavisi kanserin tipine, evresine, hastanın cinsiyetine ve yaşına göre bireylerin cinselliğini farklı düzeylerde etkileyebilmektedir (4). Kanser tanısı ilk konulduğunda, olayın stresi ile baş etme, iyileşme çareleri arayışı ve ölüm korkusu nedeniyle, hasta için cinsel sağlık akla gelen en son konu olmasına karşın, kanser tanı ve tedavisinden sonra öncelikli sorunlardan biri haline gelebilmektedir (5). Cinsel aktivitede istek kaybı kanser hastası olan kadın ve erkeklerin hepsinde görülebilirken, erkeklerde erekşiyonu sürdürme yetersizliği, kadınlarda ise vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki en yaygın karşılaşılan cinsel sorunlar arasında yer almaktadır (6,7).

Bireylerin yaşam kalitesinin optimal düzeyde sürdürülmesi için cinsel bakım gereksinimlerinin belirlenmesi gerekmektedir, ancak hastaların çoğu cinsellik hakkında endişe, utanma ve korku nedeniyle sağlık bakım ekibi ile konuşmaktan çekinebilmektedir (8). Kolorektal ve jinekolojik kanser hastalarının tedavi sürecinde ve sonrasında çeşitli cinsel sorunlarla karşı karşıya kaldığı açıklıktır, ancak hastaların cinsellik algılarının ve cinsel bakım gereksinimlerinin açıklasdırılması gerekmektedir. Kolorektal ve jinekolojik kanseri olan bireylerin cinsellik konusunda danışmanlık gereksinimleri bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Gündüz Kemoterapi Ünitesinde tedavi alan kolorektal ve jinekolojik kanseri olan hastaların cinsellik algılarını ve cinsel bakım gereksinimlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmamanın Yeri ve Örneklemi

Araştırma verileri Ekim 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Gündüz Kemoterapi Ünitesinde tedavi alan, kolorektal ya da jinekolojik kanser tanısı olan 75 hastadan toplanmıştır. Araştırmada örneklem sınırlaması yapılmamış olup, altı ay süresince hastaneye kemoterapı tedavisi amacıyla başvuran bütün hastalara ulaşılma

calışılmıştır. Ekim 2016 ve Mart 2017 aylarında Akdeniz Üniversitesi Gündüz Kemoterapi Ünitesinde kolorektal ya da jinekolojik kanser tanısı nedeniyle kemoterapi alan toplam 140 hasta ile görüşülmüş, ancak hastaların yalnız 75'i çalışmaya katılmaya gönüllü olmuştur. Kemoterapi tedavisi gören, 18 yaşın üzerinde olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 75 hasta ile araştırma tamamlanmıştır. Çalışmaya katılmayı istemeyen ve kanserin orijini kolorektal ya da jinekolojik bölge olmayan hastalar örnek grubuna alınmamıştır.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Değerlendirilmesi

Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak hazırlanmış olan 38 soruluk veri toplama formu aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama formunun ilk bölümünü; katılımcıların yaşı, eğitim düzeyi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık ortalama gelirini içeren sorulardan, ikinci bölümünü; hastanın tıbbi tanısını, tanıyı alma süresini, metastaz durumunu, aldığı tedavileri, eş destegini içeren sorulardan, son bölüm ise; kemoterapi tedavisinin hastaların cinsel yaşamı üzerine etkilerini ve hastaların bu konudaki algılarını içeren soruları içermektedir. Çalışmaya başlamadan önce kolorektal ve jinekolojik kanser hastalarına bakım veren üç hemşireden veri toplama formuna ilişkin uzman görüşü alındıktan sonra anket formu hastalara uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel analizler için SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, yüzde, ortalama, standart sapma ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirilerek, p değeri 0.05'ten küçük ise anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Etik Boyutu

Araştırmaya başlamadan önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölüm Başkanından çalışma izni alınmıştır. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Tip Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik kurul onayı alınmıştır (Tarih ve no: 23.03.2016/204). Veri toplama formu doldurulmaya başlamadan önce katılımcılardan yazılı ve sözlü onam alınmıştır. Araştırmamanın katılımcılar üzerinde hiçbir riski ya da olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

BULGULAR

Katılımcıların Özellikleri

Araştırma katılım oranı % 53 (140 hastanın 75'i katılmayı kabul etmiştir), katılımcıların yaş ortalaması $52,6 \pm 9,1$

(min=32, max=72), kanser tanısı alma süresi ortalaması $25,1 \pm 2,6$ olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %66,7'si kadın (n=50), %33,3'ü erkeklerden (n=25) oluşturmaktadır. Bireylerin yarısının eğitim durumu ilköğretim düzeyinde iken, %21,3'ü üniversite mezunu olduğu görülmüştür. Katılımcıların %93,3'ü çocuk sahibi olduğunu, %74,4'ü şu anda çalışmadığını belirtmiştir. Hastaların %42,7'sinin jinekolojik kanser (n=32), %57,3'ünün ise kolorektal kanser (n=43) nedeniyle tedavi gördüğü belirlenmiştir. Katılımcıların %81,3'ü tedavi sürecinde eşlerinin desteğinin yeterli olduğunu belirtmiştir (Tablo I).

Kemoterapi Sürecinin Cinsellik Üzerine Etkileri Konusunda Bireylerin Algıları

Hastaların %74,7'si kemoterapi süresince kaliteli bir cinsel yaşamı olabileceğini düşünmemektedir. Kemoterapi tedavisi sürecinde cinselliğin kendileri için önemli bir gereksinim olmadığını düşünenlerin oranı %73,3'tür. Kemoterapi sürecinde hastaların %74,7'sinin cinsel isteği olumsuz etkilenmiştir. Tedavi sürecinde cinsellikle ilgili duyguları olumsuz etkilenenlerin oranı %73,3 iken, katılımcıların %92'si kemoterapi tedavisinin cinsel ilişkisi sıklığını azalttığını belirtmektedir. Hastaların %68'inin

Tablo I: Katılımcıların tanıtıçı bilgileri.

Özellik	Mean ±SS		
	n	%	
Yaş		52,6±9,1	
Aylık gelir (TL)		2020,6±867,2	
Tanı süresi (ay)		25,1±2,6	
Özellikler			
Cinsiyet			
Kadın	50	66,7	
Erkek	25	33,3	
Eğitim durumu			
Okur-yazar değil	4	5,3	
İlköğretim	38	50,7	
Lise	17	22,7	
Üniversite/Lisansüstü	16	21,3	
Çocuk			
Var	70	93,3	
Yok	5	6,7	
Çalışma durumu			
Evet	19	25,3	
Hayır	56	74,7	
Tibbi Tanı			
Jinekolojik kanser	32	42,7	
Kolorektal kanser	43	57,3	
Metastaz			
Var	43	57,3	
Yok	32	42,7	
Kronik hastalık (kanser dışında)			
Var	27	36,0	
Yok	48	64,0	
Hastalığın cinsellik üzerine etkileri hakkında bilgi			
Evet	34	45,3	
Hayır	41	54,7	
Eş desteği			
Yeterli	61	81,3	
Yetersiz	14	17,7	

kemoterapi tedavisinden sonra cinsel ilişkiden aldıkları doyum azalmıştır. Hastaların %54,7'si kemoterapi tedavisi sırasında cinsel ilişkinin ertelenmesi gerektiğini, %49,3'ü cinsel yaşamın aktif olmasının tedaviyi olumsuz etkilediğini, %72'si tedavi sırasında cinselliklerinin kısıtlandığını ve %60'ı kemoterapinin cinsel problemleri beraberinde getirdiğini belirtmiştir. Araştırma kapsamına alınan bireylerin %50,7'si tedavi ile birlikte eşinin kendisine olan cinsel ilgisinin azaldığını belirtirken, %61,3'ü cinsel ilişkiye girmekten korktuklarını ifade etmişlerdir.

Kemoterapi Sürecinin ve Semptomlarının Cinsellik Üzerine Etkileri

Hastaların %33,3'ü kemoterapi tedavisinden sonra cinsel ilişki sıklığının azaldığını, %28'i ilişkisi süresinin kısallığını

ve kalitesinin azaldığını, %38,7'si ise kemoterapi almaya başladıkta sonra hiç cinsel ilişkiye girmeden belirtmiştir. Katılımcıların %41,3'ü cinsel isteksizlik, %16'sı enerji azalması, %5,3'ü erken boşalma, %1,3'ü boşalamama, %13,3'ü vajinal kuruluk, %4'ü ereksiyon olamama ve %12'si ağrılı cinsel ilişki yaşadıklarını, %2,7'si ise cinsel hayatların tedavi sonrasında tamamen bittiğini belirtmiştir. (Tablo II).

Araştırmada kemoterapi semptomlarının bireylerin cinsel yaşamı üzerine etkileri sorulmuştur. Araştırmaya katılan katılımcıların cinsel yaşamlarını en çok etkileyen şeyin enfeksiyon kapma korkusu olduğu görülmüştür (%78,7). Ayrıca, araştırmaya katılan bireylerin %34,4'ü fiziksel görünümlelerinde olan değişim, %60'ı stres, %37,3'ü ağrı,

Tablo II: Kemoterapi sürecinin cinsellik üzerine etkileri konusunda bireylerin algıları.

Sorular	n	%
Kaliteli bir cinsel yaşamınız olabileceğini düşünüyor musunuz?		
Evet	19	25,3
Hayır	56	74,7
Cinselliğin sizin için önemli bir gereksinim olduğunu düşünüyor musunuz?		
Evet	20	26,7
Hayır	55	73,3
Cinsel isteğinizi olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?		
Evet	56	74,7
Hayır	19	25,3
Cinselliğle ilgili duygularınızın olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?		
Evet	55	73,3
Hayır	20	26,7
Cinsel ilişki sıklığınızın azalttığını düşünüyor musunuz?		
Evet	69	92,0
Hayır	6	8,0
Cinsel ilişkiden aldığıniz doyumda değişiklik olduğunu düşünüyor musunuz?		
Evet	51	68,0
Hayır	24	32,0
Cinselliğin ertelenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?		
Evet	41	54,7
Hayır	34	45,3
Cinsel yaşamın aktif olmasının etkinliğini azalttığını düşünüyor musunuz?		
Evet	37	49,3
Hayır	38	50,7
Cinsel yaşamınızın hiçbir şekilde kısıtlanmadığını düşünüyor musunuz?		
Evet	21	28,0
Hayır	54	72,0
Kemoterapinin cinsel problemleri beraberinde getirdiğini düşünüyor musunuz?		
Evet	45	60,0
Hayır	30	40,0
Eşinizin size karşı olan cinsel ilgisinin azaldığını düşünüyor musunuz?		
Evet	38	50,7
Hayır	37	49,3

Tablo II: devam

Sorular	n	%
Cinsel ilişkiye girmekten korkuyor musunuz?		
Evet	46	61,3
Hayır	29	38,7
Cinsellikle ilgili sorularınızı sağlık çalışanlara rahatça sorabiliyor musunuz?		
Evet	33	44,0
Hayır	42	56,0
Cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlayacak birinin destegine gereksinim duyuyor musunuz?		
Evet	32	42,7
Hayır	43	57,3
Onkoloji hastalarına özel cinsel sağlık danışmanlığı verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?		
Evet	52	69,3
Hayır	23	30,7
Onkoloji hastalarına özel bir cinsel sağlık danışmanlık programı geliştirsek katılmak ister miyiniz?		
Evet	41	54,7
Kararsız	34	45,3
Kemoterapi uygulamasıyla birlikte cinsel yaşamda meydana gelen değişiklikler		
Tedaviye başladıkten sonra hiç cinsel ilişkiye girmedim.	29	38,7
İlişki sıklığım azaldı	25	33,3
İlişki süresi ve kalitesi azaldı	21	28,0
Karşılaşılan cinsel problemler		
Cinsel isteksizlik	31	41,3
Enerji azalması	12	16,0
Erken boşalma	4	5,3
Boşalamama	1	1,3
Vajinal kuruluk	10	13,3
Ereksiyon olamama	3	4,0
Ağrılı cinsel ilişki	9	12,0
Cinsel hayatın tamamen bitmesi	2	2,7
Hiç problem olmadı	3	4,0
Cinsel sağlığınıza ilgili merak edilen konular		
Tedavinin cinsellik üzerine etkileri neler?	33	44,0
Cinsel ilişki ile kanser eşime de geçer mi?	12	16,0
Bedenime ve sağlığımıza zarar vermeden cinsel ilişkiye nasıl gireriz?	4	5,3
İlişkiye bağlı enfeksiyonдан korunmak için ne yapmalıyım?	9	12,0
İlişki ile kanser başka bölgelere sıçrar mı?	2	2,7
Ağrısız cinsel ilişki için ne yapmalıyım?	5	6,7
Merak ettiğim bir konu yok.	10	13,3

%)20'si istahsızlık, %28'i bulantı, %13,3'ü kusma, %18,7'si ishal, %33,3'ü kabızlık, %60'ı yorgunluk, %34,7'si uykusuzluk nedeniyle cinsel yaşamlarının etkilendiğini belirtmiştir (Tablo III).

Hastaların kemoterapi sürecinde cinsellikle ilgili merak ettikleri konular sorgulandığında; %44'ünün tedavinin cinsellik üzerine etkileri, %16'sının cinsel ilişki ile kanserin eslerine bulaşma ihtimali, %5,3'ünün bedenine zarar vermeden nasıl cinsel ilişkiye gireceği, %12'sinin ilişki sırasında enfeksiyondan nasıl korunacağı, %2,7'sinin

kanserin ilişki ile yayılıp yayılmayacağı, %6,7'sinin ağrısız cinsel ilişki için ne yapması gerektiği konusunda bilgi almak istediği görülmüştür. Katılımcıların %56'sı sağlık çalışanlarına soru sormaya çekindiklerini, %57,3'ü cinsellikle ilgili sorularını yanıtlayacak bir kişiye ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdir (Tablo II).

Çalışma kapsamına alınan kadınların %86'sı kemoterapi sürecinde cinselliğin önemli bir gereksinim olmadığını ifade ederken, erkeklerin %52'si cinselliğin önemli bir gereksinim olduğunu belirtmiştir ($p<0,05$). Kadınların

da, erkeklerin de tamamına yakını kemoterapi tedavisinin cinsel ilişki sıklığını azalttığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan kadınların %72'si, erkeklerin ise %60'ı kemoterapi tedavisinden sonra cinsel ilişkiden alındıkları doyumun değiştiğini belirtmiştir. Kadınların %62'si, erkeklerin %56'sı kemoterapi tedavisinin cinsel sorunları beraberinde getirdiğini belirtmiştir. Kadınların %66'sı, erkeklerin %52'si kemoterapi tedavisi sırasında cinsel ilişkiye girmekten korktuklarını ifade etmişlerdir. Jinekolojik kanser hastalarının %75,5'i, kolorektal kanser hastalarının ise %51,1'i kemoterapi tedavisi sırasında cinsel ilişkiye girmekten korktuklarını belirtmiştir ve aralarındaki farkın

Tablo III: Kanser nedeniyle yaşanan sorunların cinselliğe etkileri.

Kansere bağlı yaşanan sorunlar	n	%
Fiziksel görünümdeki değişme		
Evet	26	34,7
Hayır	49	65,3
Enfeksiyon kapma korkusu		
Evet	59	78,7
Hayır	16	21,3
Stres		
Evet	45	60,0
Hayır	30	40,0
Ağrı		
Evet	28	37,3
Hayır	47	62,7
İstahsızlık		
Evet	15	20,0
Hayır	60	80,0
Bulantı		
Evet	21	28,0
Hayır	54	72,0
Kusma		
Evet	10	13,3
Hayır	65	86,7
İshal		
Evet	14	18,7
Hayır	61	81,3
Kabızlık		
Evet	25	33,3
Hayır	50	66,7
Yorgunluk		
Evet	45	60,0
Hayır	30	40,0
Uykusuzluk		
Evet	26	34,7
Hayır	49	65,3

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür ($p<0,05$). Jinekolojik kanser olan bireylerin %65,7'si, kolorektal kanser olanların ise %55,8'i kemoterapi tedavisinin cinsel sorunları beraberinde getirdiğini belirtmiştir. Jinekolojik kanser hastalarının %71,8'i onkoloji hastaları için özel cinsel sağlık danışmanlığı verilmesi gerektiğini söylemektedir, bu oran kolorektal kanser hastalarında %67,4 olarak belirlenmiştir (Tablo IV).

TARTIŞMA

Kanser hastalarında, kansere ve tedavisine bağlı pelvik sinirlerde, damar yapılarında ve organlarda hasar meydana gelebilmektedir. Ayrıca, kanser tedavisine bağlı yaşanan yorgunluk, uykusuzluk, beden imajında bozulma, bulantı, üriner ve fekal inkontinans gibi problemlerin cinsel aktiviteyi sürdürmede sıkıntıya neden olduğu bildirilmektedir (9,10). Benzer şekilde, bizim araştırmamızda da, kanser hastaları yorgunluk, stres, uykusuzluk, ağrı, kabızlık, bulantı ve fiziksel görünümde değişiklik nedeniyle cinsel yaşamlarının olumsuz etkilendiğini bildirmiştir. Ayrıca kanser hastalarında enfeksiyon kapma korkusunun (%78,7) kemoterapiye bağlı cinsel yaşamlarını etkileyen en önemli sorun olduğu saptanmıştır. Hastaların yaklaşık üçte biri kemoterapi tedavisinden sonra cinsel ilişki sıklığının, süresinin, kalitesinin azaldığını, %38,7'si ise, kemoterapi almaya başladıkten sonra hiç cinsel ilişkiye girmediğini belirtmiştir. Hastaların cinsel isteksizlik, enerji azalması, ağrılı cinsel ilişki, erken boşalma, boşalamama, vajinal kuruluk, erekşiyon olamama gibi çeşitli sorunlar yaşadığı, %2,7'sinin ise cinsel hayatların tedavi sonrasında tamamen bittiği belirlenmiştir. Cinsel istekte azalmanın bütün kanser türleri için hastalarının en sık yaşadığı ortak sorun olduğu çok sayıdaki araştırmada vurgulanmıştır (11-14). Bunun yanı sıra, cinsel organda kanser ve tedavisine bağlı meydana gelen hasarın hastaların cinsel ilişkide sorun yaşamamasına neden olduğu gösterilmiştir (10,13,15).

Çalışmamızda jinekolojik kanser hastalarının, kolorektal kanser hastalarına göre cinsel ilişkiye girmekten daha fazla korkutukları ve daha fazla cinsel sorunlar yaşadığı görülmüştür. Ayrıca, jinekolojik kanser hastalarının kolorektal kanser hastalarına göre cinsellikle ilgili danışmanlık alma taleplerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Flynn ve ark. tarafından (16) yapılan bir çalışmada, kanser hastalarının yarıya yakınının sağlık profesyonellerine cinsellikle ilgili soru sorabildiği, soruların tanı türüne göre farklılık gösterdiği, en çok danışmanlık alanların prostat kanseri hastalarının olduğu, en az danışmanlık alanların ise akciğer kanseri hastalarının olduğu görülmüştür. Farklı kanser grupları ile yapılan bir çalışmada, prostat ve serviks kanseri hastalarının cinsellikle ilgili konuları diğer kanser gruplarına göre sağlık personeli ile daha rahat tartışabildikleri gösterilmiştir (17). Diğer bir çalışmada ise, prostat kanseri hastalarının cinsel sağlık

Tablo IV: Cinsiyetin kemoterapiye bağlı yaşanan sorunlara etkileri.

Cinsellikle ilgili düşünceler	Cinsiyet								Tanı			
	Kadın (n=50)		Erkek (n=25)		p	X ²	Jinekoloji (n=32)		Kolorektal (n=43)		p	X ²
	n	%	n	%			n	%	n	%		
Kaliteli bir cinsel yaşamınız olabileceğini düşünüyor musunuz?												
Evet	12	24,0	7	28,0	.70	.141	10	31,2	19	44,1	.30	1.033
Hayır	38	76,0	18	72,0			22	68,8	24	55,9		
Cinselliğin önemli bir gereksinim olduğunu düşünüyor musunuz?												
Evet	7	14,0	13	52,0	.01	12.307	6	18,8	14	32,5	.18	1.789
Hayır	43	86,0	12	48,0			26	81,2	29	67,5		
Cinsel isteğinizin olumsuz etkilendigini düşünüyor musunuz?												
Evet	38	76,0	18	72,0	.70	.141	24	75,0	32	74,4	.95	0.003
Hayır	12	24,0	7	28,0			8	25,0	11	25,6		
Cinsel ilişki sıklığınızın azaldığını düşünüyor musunuz?												
Evet	45	90,0	24	96,0	.34	.910*	30	93,7	39	90,7	.63	.232
Hayır	5	10,0	1	4,0			2	6,3	4	9,3		
Cinsel ilişkiden aldiğiniz doyumda değişiklik olduğunu düşünüyor musunuz?												
Evet	36	72,0	15	60,0	.29	1.103	23	71,8	28	65,1	.53	.385
Hayır	14	28,0	10	40,0			9	28,2	15	34,9		
Cinselliğin ertelenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?												
Evet	30	60,0	11	44,0	.18	1.722	20	62,5	21	48,8	.24	1.382
Hayır	20	40,0	14	56,0			12	37,5	22	51,2		
Cinsel yaşamın aktif olmasının tedavinin etkinliğini azalttığını düşünüyor musunuz?												
Evet	25	50,0	12	48,0	.87	.027	18	56,3	19	44,1	.30	1.068
Hayır	25	50,0	13	52,0			14	43,7	24	55,9		
Cinsel yaşamınızın hiçbir şekilde kısıtlanmadığını düşünüyor musunuz?												
Evet	15	30,0	6	24,0	.58	.298	11	34,4	10	23,3	.28	1.125
Hayır	35	70,0	19	76,0			21	65,6	33	76,7		
Kemoterapinin cinsel problemleri beraberinde getirdiğini düşünüyor musunuz?												
Evet	31	62,0	14	56,0	.61	.250	21	65,7	24	55,8	.39	.736
Hayır	19	38,0	11	44,0			11	34,3	19	44,2		
Eşinizin size karşı cinsel ilgisinin azaldığını düşünüyor musunuz?												
Evet	25	50,0	13	52,0	.87	.027	15	46,9	23	53,4	.57	.321
Hayır	25	50,0	12	48,0			17	53,1	20	46,6		

Tablo IV: devam

Cinsel ilişkiye girmekten korkuyor musunuz?												
Evet	33	66,0	13	52,0	.24	1.377	24	75,0	22	51,1	.03	4.396
Hayır	17	34,0	12	48,0			8	25,0	21	48,9		
Cinsellikle ilgili sorularınızı sağlık çalışanlarına rahatça sorabiliyor musunuz?												
Evet	23	46,0	10	40,0	.62	.244	15	46,8	18	41,8	.66	.187
Hayır	27	54,0	15	60,0			17	53,2	25	58,2		
Cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlayacak birisinin desteğine gereksinim duyuyor musunuz?												
Evet	24	48,0	8	32,0	.18	1.744	15	46,8	17	39,5	.52	.404
Hayır	26	52,0	17	68,0			17	53,2	26	60,5		
Onkoloji hastalarına özel cinsel sağlık danışmanlığı verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?												
Evet	37	74,0	15	60,0	.21	1.526	23	71,8	29	67,4	.68	.170
Hayır	13	26,0	10	40,0			9	28,2	14	32,6		

* Beklenen değer 5'in altında olduğundan Fisher Kesin Testi yapılmıştır.

problemlerini konuşma oranı %60 iken, bu oran kolorektal kanserde %29 olarak bildirilmiştir (16).

Bizim çalışmamızda, kanser hastalarının büyük çoğunluğu kemoterapi süresince kaliteli bir cinsel yaşamlarının olamayacağını, bu süreçte cinselliğin kendileri için önemli bir gereksinim olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca, hastaların büyük çoğunluğu kemoterapi sürecinde cinsel isteklerinin ve cinsellikle ilgili duygularının olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Hastaların yarısından fazlası kanser tedavisi sürecinde eşlerinin kendilerine karşı olan cinsel ilgisinin azaldığını ve cinsel ilişkiye girmekten korkutuklarını belirtmişlerdir. Jinekolojik kanser hastalarının cinsellikle ilgili endişelerinin yer aldığı bir sistematik derlemede hastaların psikolojik boyutta, libido azalması, beden imajında değişiklikler ve cinsel performans ile ilgili endişelerinin olduğu, ayrıca hastaların cinsel rolleri, eşten duygusal olarak uzaklaşma ve eşin cinsel ilgi seviyesindeki değişim gibi sosyal boyutları olan sorunlar yaşadığı belirtilmiştir (18). Benzer bir şekilde jinekolojik kanser hastalarıyla yapılan farklı çalışmalarда, hastalar eşlerinin kendilerine olan cinsel ilgisinin azaldığını, evliliklerinde sıkıntı yaşamaktan ya da ayrılmaktan korkutuklarını ifade etmişlerdir (18-20).

Bu çalışmada, kadın ve erkekler arasında cinsel sorunlar konusunda sağlık profesyonellerini tartışma ve bu konuda danışmanlık ihtiyacı bakımından farklılık saptanmamıştır. Ancak, kadınların erkeklerle göre kemoterapi süresinde cinsel yaşamını daha fazla göz ardı ettikleri, cinsel

yaşamlarının daha az aktif olduğu, doyumların azaldığı, daha fazla cinsel sorunlar yaşadığı gösterilmekle birlikte her iki cinsiyetinde yaridan fazlasının kemoterapi sürecinde cinsel yaşamlarının olumsuz etkilendiği görülmüştür. Flynn ve ark. (16) cinsellik konusunda kadınların erkeklerle göre daha az danışmanlık aldıklarını belirtmişlerdir. Gilbert ve ark. (4) kanser hastaları ve partnerlerini kapsayan çalışmalarında, erkek hastaların kadınlara göre cinsellikle ilgili endişelerini daha sık tartışıklarını ve cinsel sorunlarını konuşmakta daha istekli olduklarıını belirtmişlerdir. Kanser tedavisi gören hastaların en az %50'sinin cinsel sorunlar yaşadığı bildirilmektedir (21). Erkeklerin kadınlara göre cinsellikle ilgili daha fazla soru sorduğu, ancak cinsellikle ilgili kendi sorunlarını daha az ifade ettiği görülmüştür (16).

Bu çalışmanın en önemli sonucu, kemoterapi alan kanser hastalarının büyük çoğunluğunun cinsellikle ilgili konuşmayı kabul etmekte zorlanmalarıdır. Ekim 2016-Mart 2017 tarihleri arasında jinekolojik kanser veya kolorektal kanser nedeniyle kemoterapi almak için başvuran hasta 140 olmasına rağmen, 140 hastanın 75'i çalışmaya katılmayı kabul etmiş, diğerleri cinsellik hakkında konuşmak istemediklerini belirtmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastaların %56'sı sağlık çalışanlarına soru sormaya çekindiğini belirtirken, %57,3'ü cinsellikle ilgili sorularını yanıtlayacak bir kişiye ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Nitekim, cinselliğin kanser hastalarının büyük çoğunluğunun en az danışmanlık aldığı durumlardan biri olduğu belirtilmektedir (4,17). Kanser hastalarının

cinselliğle ilgili konuşma gereksinimlerinin olduğu, ancak konunun sağlık profesyonelleri tarafından gündeme getirilmesini bekledikleri saptanmıştır (22,23). Diğer taraftan, sağlık profesyonellerinin de hastalarla cinselliği konuşmayı göz ardi ettiğleri ve bu konuyu konuşmaktan çekindikleri çalışmalarda belirlenmiştir (24-26).

Katılımcıların yaşıları 32 ile 72 arasında değişmesine rağmen yaş ortalamalarının 52,6 olduğu görülmüştür. Yalnızca insanların cinsel olarak daha aktif oldukları genç yaşlarda kanserin cinsellik üzerine etkilerinin belirlenmemesi, katılımcıların çoğunun orta yaşı grubunda olması araştırmanın bir sınırlılığıdır. Ayrıca, kolostomi açılması, histerektomi ameliyatı gibi pelvik bölgeye yapılan cerrahi ve tıbbi tedavinin hastaların cinsel yaşamını daha fazla etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışma kapsamına sadece kolorektal kanseri ya da jinekolojik kanseri olan hastalar alınmıştır. Kemoterapi gören diğer kanser hastalarının araştırma kapsamına alınmaması araştırmanın diğer bir sınırlılığıdır.

SONUÇ

Kolorektal ve jinekolojik kanser hastalarının tedavi ve tanı sürecinde cinsel yaşamlarına ilişkin yüksek oranda endişeleri olmasına rağmen, çok az hastanın bu durumu sağlık profesyonelleri ile tartışabildiği belirlenmiştir. Kemoterapi tedavisi sürecinde kadın hastaların cinsellikle ilgili sorularını erkek hastalara göre daha az dile getirdikleri, ancak hastaların cinsiyet ayrimı gözetmeksizin tamamının cinsel sorunlar hakkında bilgilendirilme ve danışmanlık taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu nedenle, cinselliğin kanserin tanı, tedavi ve tedavi sonrası dönemde hastaların en önemli sorunlarından biri olmasının yanı sıra, hastaların cinsel sağlıklarının değerlendirilmesi, bireylere özel cinsel danışmanlık hizmetlerinin sunulması gerekiği düşünülmektedir. Onkoloji alanında cinselliğin diğer tüm temel insan gereksinimleri gibi göz ardi edilmemesi gereken bir konu olduğu, bu konuda yapılacak olan girişimlerin hastaların yaşam kalitesini iyileştireceği unutulmamalıdır.

KAYNAKLAR

- Bozdemir N, Özcan S. Cinselliğe ve cinsel sağlığa genel bakış. *Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care* 2011; 5(4): 37-46.
- Oskay U, Can G, Basgol S. Discussing sexuality with cancer patients: oncology nurses attitudes and views. *Asian Pac J Cancer Prev* 2014; 15(17): 7321-6.
- Brotto LA, Erskine Y, Carey M, Ehlen T, Finlansoy S, Heywood M, Kwon J, Mcalpine J, Stuart G, Thomson S, Miller D. A brief mindfulness-based cognitive behavioral intervention improves sexual functioning versus wait-list control in women treated for gynecologic cancer. *Gynecol Oncol* 2012; 125: 320-5.
- Gilbert E, Ussher JM, Perz J. Embodying sexual subjectivity after cancer: A qualitative study of people with cancer and intimate partners. *Psychol Health* 2013; 28(6): 603-19.
- Reis N. Jinekolojik kanser ve tedavilerinin kadın cinsel sağlığına etkileri. *C.U.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi* 2003; 7(2): 35-40.
- Donovan KA, Taliaferro LA, Alvarez EM, Jacobsen PB, Roetzheim RG, Wenham RM. Sexual health in women treated for cervical cancer: Characteristics and correlates. *Gynecol Oncol* 2007; 104(2): 428-34.
- Lim RS, Yang TX, Chua TC. Postoperative bladder and sexual function in patients undergoing surgery for rectal cancer: A systematic review and meta-analysis of laparoscopic versus open resection of rectal cancer. *Tech Coloproctol* 2014; 18: 993-1002.
- Lee JT, Lin HH, Tsai JL, Chen JP, Hang KG, Yu-Lien AD. Transformation of sexual expression in Taiwanese women after treatment for gynecological cancer. *Cancer Nurs* 2015; 3(6): 475-83.
- Dunberger G, Lind H, Steineck G, Waldenstrom AC, Nyberg T, Al-Abany M. Self-reported symptoms of faecal incontinence among long-term gynaecological cancer survivors and population-based controls. *Eur J Cancer* 2010; 46: 606-15.
- Sacerdoti R, Lagana L, Koopman C. Altered sexuality and body image after gynecological cancer treatment: How can psychologists help? *Prof Psychol Res Pr* 2010; 41(6): 533-40.
- Matthews A, Aikens J, Helmrich S, Anderson D, Herbst A, Waggoner S. Sexual functioning and mood among long-term survivors of clear-cell adenocarcinoma of the vagina or cervix. *J Psychosoc Oncol* 2000; 17(3): 27-45.
- Gershenson D, Miller A, Champion V, Monahan P, Zhao Q, Cella D, et al. Reproductive and sexual function after platinum-based chemotherapy in long-term ovarian germ cell tumor survivors: A gynecologic oncology group study. *J Clin Oncol* 2007; 25(19): 2792-7.
- Traa M J, De Vries J, Roukema JA, Den Oudsten B L. Sexual (dys) function and the quality of sexual life in patients with colorectal cancer: A systematic review. *Ann Oncol* 2012; 23(1): 19-27.
- Whicker M, Black J, Altwerger G, Menderes G, Feinberg J, Ratner E. Management of sexuality, intimacy, and menopause symptoms in patients with ovarian cancer. *Am J Obstet Gynecol* 2017. doi: 10.1016/j.ajog.2017.04.012. [Epub ahead of print].

15. Frumovitz M, Sun C, Schover L, Munsell M, Jhingran A, Wharton JT. Quality of life and sexual functioning in cervical cancer survivors. *J Clin Oncol* 2005; 23(20): 7428–36.
16. Flynn KE, Reese JB, Jeffery DD, Abernethy AP, Lin L, Shelby RA, Porter LS, Dombeck CB, Weinfurt KP. Patient experiences with communication about sex during and after treatment for cancer. *Psycho-oncology* 2012; 21: 594–601.
17. Charif AB, Bouhnik AD, Courbiere B, Rey D, Préau M, Bendiane MK, Mancini J. Patient discussion about sexual health with health care providers after cancer-A national survey. *J Sex Med* 2016; 13(11): 1686-94.
18. Abbott-Anderson K, Kwekkeboom KL. A systematic review of sexual concerns reported by gynecological cancer survivors. *Gynecol Oncol* 2012; 124(3): 477-89.
19. Corney R, Crowther M, Everett H, Howells A, Shepherd J. Psychosexual dysfunction in women with gynaecological cancer following radical pelvic surgery. *Br J Obstet Gynaecol* Jan 1993; 100: 73–8.
20. Stead M, Fallowfield L, Selby P, Brown J. Psychosexual function and impact of gynecological cancer. *Best Pract Res Clin Obstet* 2007; 21(2): 309–20.
21. Sadovsky R, Basson R, Krychman M, Morales AM, Schover L, Wang R. Cancer and sexual problems. *J Sex Med* 2010;7: 349–73.
22. Katz A. The sounds of silence: Sexuality information for cancer patients. *J Clin Oncol* 2005; 23(1): 238-41.
23. Rassmusson ED, Plantin L, Elmerstig E. Did they think i would understand all that on my own? A questionnaire study about sexuality with Swedish cancer patients. *Eur J Cancer Care* 2013; 22: 361-9.
24. Marshall C, Kiemle G. Breast reconstruction following cancer: Its impact on patients' and partners' sexual functioning. *Sex Relatsh Ther* 2005; 20: 155-79.
25. Hautamäki K, Miettinen M, Kellokumpu-Lehtinen PL, Aalto P, Lehto J. Opening communication with cancer patients about sexuality-related issues. *Cancer Nurs* 2007; 30(5): 399-404.
26. Davison BJ, Gleave ME, Goldenberg SL, Degner LF, Hoffart D, Berkowitz J. Assessing information and decision preferences of men with prostate cancer and their partners. *Cancer Nurs* 2002; 25: 42-9.